

REF	521-3 6x3mL	EXP 2024-10-17	LOT 31B790E	更新日期: 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(Alb)白蛋白	(IgG)免疫球蛋白 IgG	(IgM)免疫球蛋白 IgM
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgE)免疫球蛋白 IgE	(C3)补体 C3
(C4)补体 C4	(CRP)C反应蛋白	(RF)类风湿因子
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体	(TRF)转铁蛋白	(PAB)前白蛋白
(β2M)β-2-微球蛋白	(Ferritin)铁蛋白	(PRO/ TP)(总) 蛋白
(AT-III)抗凝血酶III	(IgG4)免疫球蛋白G4亚型	(Kappa Light Chain)κ轻链
(Lambda Light Chain)λ 轻链	(RBP)视黄醇结合蛋白	(Cer)铜蓝蛋白
(C1q)补体C1q	(Free Lambda Light Chain)游离轻链λ	(Free Kappa Light Chain)游离轻链κ
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶		

REF	521-3	6x3mL	EXP	2024-10-17	LOT	31B790E	更新日期:	2025-03
								2 / 3

批号: 31B790E			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	56.2	42.7-69.7
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman AU series BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	327	305-349
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	356	337-375
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	350	332-368
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	225	171-279
(AT-III)抗凝血酶III			
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	25	19-31
(C1q)补体C1q			
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	409	379-439
(C3)补体 C3			
Beckman AU series BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	228	209-247
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	235	211-259
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	242	222-262
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	219	166-272
(C4)补体 C4			
Beckman AU series BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	51.9	48.4-55.4
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	54.6	50.2-59
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	61.3	56.2-66.4
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.8	43.9-71.7
(Cer)铜蓝蛋白			
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.613	0.581-0.645
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.4	0.304-0.496
(CRP)C反应蛋白			
Siemens ADVIA Chemistry XPT Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	5.7	5.2-6.2
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.66	6.25-7.07
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.72	5.87-9.57
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	357	271-443
(Free Kappa Light Chain)游离轻链k			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	14.8	12.8-16.8
(Free Lambda Light Chain)游离轻链λ			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	18.5	12.7-24.3
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	500	451-549
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	428	387-469
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	359	273-445
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	69.8	53-86.6
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2250	1980-2520
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2085	1893-2277
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2150	1634-2666
(IgG4)免疫球蛋白G4亚型			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	933	842-1024

REF	521-3	6x3mL	EXP	2024-10-17	LOT	31B790E	更新日期:	2025-03
								3 / 3

(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	293	272-314
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	262	241-283
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	245	186-304
(Kappa Light Chain)κ轻链			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	17.2	13.1-21.3
(Lambda Light Chain)λ 轻链			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	6.55-10.69
(PAB)前白蛋白			
Siemens ADVIA Chemistry XPT KHB \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.474	0.44-0.508
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	0.332-0.542
(PRO/ TP)(总) 蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ OTHER	g/L	5.23	5.14-5.32
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Siemens ADVIA Chemistry XPT KHB \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.83	8.3-9.36
Beckman AU series DongOu \ OTHER	mg/dL	8.21	7.75-8.67
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	6.4-10.44
(RF)类风湿因子			
Beckman AU series BSBE \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	111	96-126
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	94.9	87.5-102.3
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	70.5	62.6-78.4
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	91-149
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	290-472
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶			
Siemens ADVIA Chemistry XPT OTHER \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	269	252-286
(β2M)β-2-微球蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5233	4636-5830
Siemens ADVIA Chemistry XPT KHB \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6176	5818-6534
Beckman AU series DongOu \ OTHER	ng/mL	6955	6566-7344
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6730	5115-8345

注: 此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来, 仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。